



Programa de Nutrição Boratada

Cultivo do algodão



Programa de nutrição boratada: Algodão*

Aplicação / Fase	Produto	Dose (kg/ha)	Orientação
Aplicação a lanço em um período variando entre 10 dias antes do plantio até 15 dias após emergência	 GRANUBOR [®]	15	Aplicação a lanço em área total – pode ser aplicado só ou em mistura com NPKs ou KCl

Nutrição foliar: Complementar em B

Aplicação / Fase	Produto	Dose (g/ha)
25 dias após emergência	 SOLUBOR [®]	800
Florescimento pleno	 SOLUBOR [®]	800
Enchimento das maçãs	 SOLUBOR [®]	800

*As indicações de doses, épocas e forma de aplicação são sugestões baseadas em recomendações agronômicas oficiais indicadas pela pesquisa brasileira. O diagnóstico por meio da análise de solo e tecido vegetal são técnicas recomendadas para ajustes no programa de adubação. Recomendamos sempre o acompanhamento de um profissional Engenheiro Agrônomo.


Programa de nutrição boratada: Algodão



Semeadura

Segunda folha verdadeira expandida

Aplicar o *Granubor* em um período variando entre 10 dias antes do plantio até 15 dias após emergência

A diagram showing the first two stages of cotton growth. The first stage, "Semeadura", shows a seed in a pot. The second stage, "Segunda folha verdadeira expandida", shows a small seedling with two leaves. A red double-headed arrow spans across both stages, with text below it indicating the application window for Granubor.



RioTinto