





Programa de Nutrição Boratada

Cultivo de citros

Laranja, Limão, Tangerine, Murcote

Programa de nutrição boratada: Citros*

Para áreas em produção

Aplicação / Fase	Produto	Dose (kg/ha)	Orientação
1ª - Vegetativo / Pré florada	 GRANUBOR [®]	7,0	Aplicar na superfície do solo, na região mediana entre o caule e projeção da extremidade dos ramos da copa
2ª - Formação dos frutos (azeitona)	 GRANUBOR [®]	7,0	A aplicação deve ser realizada com umidade suficiente no solo

Nutrição foliar: Complementar em B

Aplicação / Fase	Produto	Dose (g/ha)
1ª - Pré florada	 SOLUBOR [®]	800
2ª - Pegamento de florada	 SOLUBOR [®]	800

*As indicações de doses, épocas e forma de aplicação são sugestões baseadas em recomendações agronômicas oficiais indicadas pela pesquisa brasileira. O diagnóstico por meio da análise de solo e tecido vegetal são técnicas recomendadas para ajustes no programa de adubação. Recomendamos sempre o acompanhamento de um profissional Engenheiro Agrônomo.

Programa de nutrição boratada: Citros*

Para áreas em produção



Florescimento



7,0 kg/ha



Formação de frutos



7,0 kg/ha



Crescimento de frutos



Colheita

Aplicar na superfície do solo, na região mediana entre o caule e projeção da extremidade dos ramos da copa. A aplicação deve ser realizada com umidade suficiente no solo



RioTinto